

# CONSENSUS ACVIM CARDIOMYOPATHIES FELINES

## Définitions de 5 stades cliniques

Chat de race prédisposée

**A**

Dépistages  
échocardiographiques  
recommandés



Stade préclinique  
Absence de dilatation atriale  
gauche/dilatation de faible  
importance

Aucun traitement actuellement  
recommandé  
Aténolol parfois employé dans les cas  
d'obstruction dynamique sévère de la  
chambre de chasse du ventricule gauche

**B1**

Stade préclinique  
Dilatation atriale gauche modérée à  
sévère

**B2**



Thromboprophylaxie  
Antiarythmiques si  
trouble du rythme  
concomitant

Insuffisance cardiaque congestive  
et/ou thromboembolie aortique (TEA)

- O<sub>2</sub>, furosemide +/- sédatifs +/- pimobendane en phase aigüe
- Furosemide +/- bédazépril +/- pimobendane en phase chronique
- Analgésie et anticoagulants en cas de TEA

**C**

Insuffisance cardiaque congestive  
réfractaire

**D**

Remplacement du furosémide par du  
torasémide  
Ajout éventuel de spironolactone et/ou  
pimobendane



**POUR PLUS DE DETAILS  
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE ONLYVET**

<http://www.onlyvet.fr>